

**BULETIN DE AVERTIZARE**

Nr.....1.....din 6 FEBRUARIE 2026

Condițiile climatice în spații deschise/în spațiile protejate: sere  solarii  răsadnițe  din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunătorului/bolii : **BOLI/DĂUNĂTORI SOL (.. COROPISNIȚA, CĂRABUȘ DE MAI, BUHA SEMĂNĂTURILOR, VIEMI SĂRMĂ, NEMATODUL GALICOL AL RĂDĂCINILOR, VIERMELE VESTIC AL RĂDĂCINILOR DE PORUMB, MANA DE SOL, FUZARIOZA, OFILIREA VASCULARĂ)** care poate cauza pierderi importante la cultura: **LEGUME ÎN SPAȚII PROTEJATE/ CÂMP DIFERITE CULTURI CÂMP**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului.....

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

**LA CONSTATAREA PREZENȚEI ORGANISMULUI DĂUNĂTOR**

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

**1. COROCID SUPER**

| Cultură RO | Agent dăunător | Nume RO     | Doză     |
|------------|----------------|-------------|----------|
| tomate     | dăunători      | coropisnita | 20 kg/ha |

sau

**2. BASAMID GRANULE**

| Cultură RO                               | Agent dăunător | Nume RO                                    | Doză  |
|--|----------------|--|---|
| legume din solarii înfiintate prin rasad | Dăunători      | coropisnita                                | 250 kg/ha   |
| tomate sera                              | Boli           | mana de sol, fuzarioza, ofilirea vasculara | 500 kg/ha - se administreaza la sol cu incorporare, inainte de plantare |
| tomate sera                              | Dăunători      | nematodul galicol al radacinilor           | 500 kg/ha - se administreaza la sol cu incorporare, inainte de plantare |

sau

**3. RAISAN 51**

| Cultură                     | Agent dăunător | Nume RO  | Doză  |
|-----------------------------|----------------|--|---|
| dezinfecția solului în sere | Boli           | Fusarium sp. (fuzarioza), Phytophthora sp. (mana), Verticillium sp. (ofilirea vasculara) | 700 L/ha Se aplica inainte de semanat sau plantat |
| dezinfecția solului în sere | Dăunători      | Meloidogyne sp. (nematodul galicol al radacinilor)                                       | 700 L/ha Se aplica inainte de semanat sau plantat |
| dezinfecția solului în sere | Buruieni       | buruieni anuale si perene  | 700 L/ha Se aplica inainte de semanat sau plantat |

sau

**4. TRIKA EXPERT**

| Cultură  | Agent dăunător | Nume RO   | Doză   |
|--|----------------|---|--|
| ardei, tomate, vinete, salata  | Dăunători      | buha sematurilor carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor  | 10-15 kg/ha<br>Incorporat in sol odata cu plantarea, cand planta are 2-4 frunze (BBCH 12-16)           |
| cartof   | Dăunători      | buha sematurilor carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor  | 10-15 kg/ha<br>Incorporat in sol odata cu plantarea (BBCH 00)  |
| castraveti, dovleac, dovlecei, pepeni  | Dăunători      | buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha<br>Incorporat in sol odata cu plantarea, cand planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14)           |
| culturi semincere (varza, cucurbitacee, salata si alte semanatoare, porumb, rapita, morcov, cartof, solanacee) | Dăunători      | buha sematurilor carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor  | 10-15 kg/ha<br>Incorporat in sol odata cu semanatul (BBCH 00) sau odata cu plantarea ( BBCH 12-14 )    |
| floarea soarelui   | Dăunători      | buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha<br>Incorporat in sol odata cu semanatul (BBCH 00)  |
| morcov   | Dăunători      | buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha<br>Incorporat in sol odata cu semanatul (BBCH 00)  |
| pepiniere silvice, floricultura si plante ornamentale  | Dăunători      | buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha<br>Incorporat in sol odata cu semanatul/plantarea, cand planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14) |
| porumb, mei, sorg  | Dăunători      | buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma                                 | 10-15 kg/ha<br>Incorporat in sol odata cu semanatul (BBCH 00)  |
| porumb, mei, sorg  | Dăunători      | viermele vestic al radacinilor  | 12-15 kg/ha<br>Incorporat in sol odata cu semanatul (BBCH 00)  |
| rapita, soia   | Dăunători      | buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha<br>Incorporat in sol odata cu semanatul (BBCH 00)  |
| varzoase pentru capatana si inflorescenta  | Dăunători      | buha sematurilor, carabusul de mai, viermii sarma, viermele vestic al radacinilor | 10-15 kg/ha<br>Incorporat in sol odata cu plantarea, cand planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14)           |

**LA PREGĂTIREA PATULUI GERMINATIV SAU  
LA SEMĂNAT, PLANTAT, ÎN FUNCȚIE DE CAZ**

Perioada optimă de tratament:

**Alte recomandări: SE VA RESPECTA CU STRICTEȚE TIMPUL DE PAUZĂ DE LA APLICARE PÂNĂ LA SEMĂNAT/ PLANTAT, ÎN FUNCȚIE DE INFORMAȚIILE SPECIFICATE PE ETICHETA PRODUSULUI**

**DE PROTECȚIE A PLANTELOR UTILIZAT.**

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.

Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apa din surse autorizate și verificate periodic (cu Ph cuprins între 7 -8;

Clatiți de 3 ori recipientii si livrați ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !  
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* ( nr. 3242/F/21.10.1016 ) și *Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS* ( nr 103/ 21.10.2016 ) , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

Întocmit, VĂRTIC MIHAELA - ROSICA Nalte  
(Nume, Prenume, Semnatura)

Se aprobă, Coordonator Oficiul Fitosanitar Zonal Bacău-Neamț,

Zaharia Gheorghe

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

#### ANEXA 2 la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....  
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....  
(Comuna, județul) .....  
Ferma (nume/număr, adresa).....

### REGISTRU

#### de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

| Data efectuării tratam.<br>(ziua luna, anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Timpul aplicării (feno faza) | Tratamentul efectuat                          |                     |                              |                | Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației |
|--|---|------------------------------|---|---------------------|------------------------------|----------------|---|--|---|
|  |   |                              | Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/buruieni | Denumie ppp folosit | Doza omologăă /doza folosită | Supra-fața, ha |   |  |   |
|  |   |                              |   |                     |                              |                |   |  |   |

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

**IMPORTANT! BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

